



Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Mansur Agricultural Services Ltda.



PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL HUILLI (*Leucocoryne*)



¡El desierto florido... en su jardín!

ORIGINALIDAD, BELLEZA Y EXCLUSIVIDAD.

**Comprar es
CONSERVAR
Bulbos de Leucocoryne**

DISFRUTE DE UNA FLOR ORIGINAL, BELLA Y EXCLUSIVA.
TENGA UN PEQUEÑO DESIERTO FLORIDO EN SU BALCÓN O JARDÍN.

Con la compra de bulbos Leucocoryne ¡AYUDAS TRES VECES!

Ayudas a... la CONSERVACIÓN
Ayudas a... el USO SUSTENTABLE
Ayudas a... COMPARTIR LOS BENEFICOS

[Revise nuestros precios](#)

Precios son por paquetes de 10 bulbos (IVA incluido).

POLÍTICA DE DESCUENTO

MONTO DE COMPRA	DESCUENTO
\$10.000 a \$20.000	5%
\$21.000 a \$50.000	10%
\$51.000 a \$100.000	15%
\$100.001 a \$200.000.....	20%
Más de \$200.000.....	30%
Manual del Leucocoryne (quedan ejemplares sólo en inglés) \$6.500 con IVA.	

¡HAGA SU PEDIDO!

Contacto: Leví Mansur (Mansur Agricultural Services Ltda.)
Teléfono: 34 - 429127
E-mail: mansur.agricultural@gmail.com

Los bulbos serán enviados por Chile Express con cargo al cliente. Orden mínima de 30 bulbos. Despacho a todo el país.

¿QUÉ HAREMOS CON EL DINERO RECAUDADO?

El dinero recaudado será destinado a solventar los gastos del **Programa de Conservación y Mejora del Huilli (*Leucocoryne*)** de la Facultad de Agronomía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (www.leucocoryne.cl).

Gracias por tu ayuda en la conservación y valoración de nuestras plantas nativas.

CARACTERÍSTICAS GENERALES Y PRINCIPALES CUIDADOS.

Tipo de Suelo: bien drenado y suelto, donde el agua escurra con facilidad.
Clima: templado.
Temperatura: 10 – 25 °C. Resiste hasta – 2 °C en periodo vegetativo.
Exposición: al sol, por lo menos mediodía (tarde o mañana).
Profundidad de plantación: 5 cm.
Riegos: quincenal (otoño - invierno), semanal (primavera).
Emergencia: 15 a 20 días después de plantación.
Floración: 100 a 130 días después de plantación. Un bulbo puede emitir hasta 3 escapos florales.
Uso: Jardinería (Macetas, Jardineras, macizos, rocallas).
Receso: Alternativa 1. Cosecha y Almacenaje de Bulbos. Cosechar los bulbos a los 60 días después de floración o al inicio del verano. Hay que esperar a que las hojas se marchiten por completo. Luego, guardar los bulbos en ambiente seco y a temperatura ambiente (20 a 25 °C) por 4 a 5 meses hasta el próximo otoño.
Alternativa 2. Dejar los Bulbos en el terreno. Durante el periodo del receso (verano) NO se riega. Reanudar el riego con la primera lluvia del otoño.